

Referenceværdier for blodprøver: voksnes normalområder i mmol/L

Reglen, der afgør det hele
Når denne tabel og dit prøvesvar siger noget forskelligt, gælder prøvesvaret. Intervallet dér er fastsat til netop den metode, der målte dit blod.

Hæmoglobin, i mmol/L

Hæmoglobin mænd		8,3–10,5 mmol/L
Hæmoglobin kvinder		7,3–9,5 mmol/L
Hæmoglobin gravide		7,0–9,1 mmol/L
Hæmoglobin piger 12–19 år		7,0–9,8 mmol/L
Hæmoglobin dreng 12–19 år		7,8–10,6 mmol/L

Lever, blodsukker, nyrer, jern og fedtstoffer

ANALYSE	TYPISK INTERVAL ELLER GRÆNSE (VOKSNE)	GODT AT VIDE
B-Hæmoglobin	8,3–10,5 mmol/L (mænd) · 7,3–9,5 (kvinder)	Gravide 7,0–9,1. Angives i mmol/L, ikke g/dL.
P-ALAT	10–70 U/L (mænd) · 10–45 (kvinder)	Læses sammen med de andre levertal, aldrig alene.
P-Glukose, fastende	under 5,6 mmol/L	5,6–6,9 regnes som forstadie, 7,0 eller mere som diabetes ved gentagelse.
HbA1c	under 39 mmol/mol	39–47 er forstadie, 48 eller mere diabetes. Kræver ikke faste.
eGFR	over 90 mL/min/1,73 m² hos yngre	Beregnet ud fra kreatinin. Falder naturligt med alderen.
Ferritin	nedre grænse ofte 30 µg/L	Stiger ved betændelse, som kan skjule jernmangel.
LDL-kolesterol	et mål, ikke et interval	Under 3,0 mmol/L ved lav risiko. Lavere mål ved højere risiko.
Triglycerid, ikke-fastende	stiger højst 0,3 mmol/L efter et måltid	Faste er sjældent nødvendig til fedtstofprøver.