

ანალიზების ნორმები: ცხრილი და რატომ აქვს ყველა ლაბორატორიას თავისი

ნესი, რომელიც ყველაფერს წყვეტს

როცა ეს ცხრილი და თქვენი ანალიზის პასუხი ერთმანეთს არ ემთხვევა, მართალია პასუხი. მისი ინტერვალი იმ აპარატისთვისაა დადგენილი, რომელმაც თქვენი სისხლი გაზომა.

სისხლის საერთო ანალიზი

ჰემოგლობინი

მამაკაცები

130–170 გ/ლ

ჰემოგლობინი

ქალები

120–155 გ/ლ

MCV

ერიტროციტის ზომა

80–100 ფლ

ლეიკოციტები

საერთო რაოდენობა

4,0–11,0 $\times 10^9$ /ლ

თრომბოციტები

150–400 $\times 10^9$ /ლ

ბიოქიმია, ღვიძლი, თირკმელი

ანალიზი	ჩვეულებრივი ინტერვალი	შენიშვნა
გლუკოზა უზმოზე	3,9–5,5 მმოლ/ლ · 70–99 მგ/დლ	მხოლოდ უზმოზე. 6,1–6,9 მმოლ/ლ ქართული პროტოკოლით გლუკოზის გაუარესებაა.
HbA1c	< 5,7%	სამი თვის საშუალო. უზმოდ ყოფნა არ სჭირდება.
კრეატინინი	62–115 მკმოლ/ლ (მ) · 53–97 (ქ)	კუნთის მასაზე დამოკიდებული. წაიკითხეთ eGFR-თან ერთად.
eGFR	> 90 მლ/წთ/1,73 მ ²	ფორმულით გამოთვლილი შეფასება და არა გაზომვა.
ALT	10–45 ერთ/ლ	წაიკითხეთ AST-სა და GGT-სთან ერთად, არასდროს ცალკე.
TSH	0,4–4,0 mIU/L	დღე-ღამის რიტმი აქვს. სჭოხს დილით აღება.
ფერითინი	30–400 ნგ/მლ (მ) · 15–200 (ქ)	ანთებისას იმატებს და შეიძლება დეფიციტი დამალოს.
LDL ქოლესტერინი	სამიზნე და არა ნორმა	დაბალი რისკისას 3,0 მმოლ/ლ-ზე დაბლა, უფრო მაღალი რისკისას კიდევ უფრო დაბლა.