

ຄ່າປຶກກະຕິຜົນກວດເລືອດຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ແມ່ນເທົ່າໃດ? ແລະ ເປັນຫຍັງ ແຕ່ລະໂຮງໝໍຈຶ່ງພິມບໍ່ຄືກັນ

ກົດທີ່ຕັດສິນທຸກຢ່າງ

ເມື່ອຕາຕະລາງນີ້ ແລະ ໃບຜົນກວດຂອງທ່ານບໍ່ກົງກັນ, ໃຫ້ເຊື່ອໃບຜົນກວດ. ຊ່ວງຂອງມັນຖືກກຳນົດສຳລັບເຄື່ອງທີ່ກວດເລືອດຂອງທ່ານແທ້ໆ.

ການນັບເມັດເລືອດ (CBC)

ຮີໂມໂກລິນ

ຜູ້ຊາຍ

13.0 – 17.0 g/dL

ຮີໂມໂກລິນ

ຜູ້ຍິງ

12.0 – 15.5 g/dL

MCV

ຂະໜາດເມັດເລືອດແດງ

80 – 100 fL

ເມັດເລືອດຂາວ

ຈຳນວນທັງໝົດ

4.0 – 11.0 $\times 10^3/\mu\text{L}$

ເກັດເລືອດ

150 – 400 $\times 10^3/\mu\text{L}$

ນ້ຳຕານ, ຕັບ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ໄທຣອຍ

ການກວດ	ຊ່ວງທີ່ພົບເລື້ອຍ	ໝາຍເຫດ
ນ້ຳຕານຕອນທ້ອງຖ່າງ (FBS)	70 – 100 mg/dL · 3.9 – 5.5 mmol/L	ຕ້ອງດຶກອາຫານກ່ອນ. 100–125 mg/dL ແມ່ນຊ່ວງກ່ອນເປັນເບົາຫວານ.
HbA1c	< 5.7 %	ຄ່າສະເລ່ຍປະມານສາມເດືອນ. ບໍ່ຕ້ອງດຶກອາຫານ.
ຄຣີອາຕີນິນ	0.7 – 1.3 mg/dL (ຊ) · 0.6 – 1.1 (ຍ)	ຂຶ້ນກັບມວນກ້າມຊີ້ນ. ອ່ານຄູ່ກັບ eGFR.
eGFR	> 90 mL/min/1.73 m ²	ຄ່າປະມານຈາກສູດ ບໍ່ແມ່ນການວັດໂດຍກົງ.
ALT	10 – 45 U/L	ອ່ານຄູ່ກັບ AST ແລະ GGT, ບໍ່ອ່ານແຍກດ່ຽວ.
TSH	0.40 – 4.00 $\mu\text{IU/mL}$	ປ່ຽນຕາມເວລາໃນມື້. ເຈາະເລືອດຕອນເຊົ້າຈະປ່ຽນໜ້າຍາກວ່າ.
ຟີຣິຕິນ	30 – 400 $\mu\text{g/L}$ (ຊ) · 15 – 200 (ຍ)	ສູງຂຶ້ນເມື່ອອັກເສບ, ອາດປົດປັ້ງການຂາດທາດເຫຼັກ.
ໄຂມັນ LDL	ເປັນເບົາໝາຍ ບໍ່ແມ່ນຊ່ວງ	ຕ່ຳກວ່າ 116 mg/dL (3.0 mmol/L) ສຳລັບຄວາມສ່ຽງຕ່ຳ; ຕ່ຳລົງອີກເມື່ອສ່ຽງສູງຂຶ້ນ.