



Blood Interpretation

Skýrsla Blood Interpretation

Heildstæð og persónuleg túlkun sem safnar öllum gögnunum þínum saman á einn stað.

ALDUR
61 árs

KYN
Karl

ÞYNGD
77 kg

HÆÐ
183 cm

BMI
23

ÁSTÆÐA TÚLKUNAR

Almenn heilsufarsskoðun

ÁFENGISNEYSLA

Stöku sinnum

TÓBAKSNOTKUN

3 sígarettur á dag

HREYFING

Meira en 150 mínútur á viku

SÉRSTAKT MATARÆÐI

Nei

EIGIN SJÚKRASAGA

Nei

SJÚKRASAGA Í FJÖLSKYLDUNNI

Háþrýstingur

LYF Í NOTKUN

Nei

NÚVERANDI EINKENNI

Nei

OFNÆMI

Frjókorn



Gervigreindarskýrsla : 21/10/2026



Skýrsla Blood Interpretation er upplýsinga- og fræðslutól, búið til með gervigreind, sem hjálpar þér að skilja niðurstöðublaðið þitt og undirbúa þig fyrir tímann hjá læknum. Hún kemur á engan hátt í stað ráðgjafar læknisins þíns og felur hvorki í sér sjúkdómsgreiningu né meðferð.





Þarfnast eftirfylgni læknis

Nýrnastarfsemi – Skert

- Nýrnastarfsemi sýnir merki um skerðingu.
- Kreatínín er 1.5 mg/dL, sem er yfir viðmiðunarmörkum (0.6–1.3 mg/dL), og nýrnahraði (eGFR) er 49 mL/min/1.73m², sem bendir til vægs til miðlungs skerðingar á síuvirkni nýrnanna.
- Þvagefni í blóði (BUN) er við efri mörk en enn eðlilegt.
- Til að staðfesta hvort um langvarandi nýrnaskerðingu sé að ræða þarf endurtekna mælingu eftir a.m.k.
- 3 mánuði ásamt mælingu á próteinútskilnaði í þvagi.
- Nauðsynlegt er að leita til heilbrigðisstarfsmanns til að meta þessa niðurstöðu nánar og ákveða næstu skref.

Lifrarensím og bilirúbín – Breytt

- Alkalískt fosfatasi (Alk Phos) er 166 U/L, sem er verulega yfir viðmiðunarmörkum (46–116 U/L).
- Þetta ensím tengist bæði beinum og lifur.
- Heildar bilirúbín er einnig hækkað í 1.9 mg/dL (viðmið 0.1–1.0 mg/dL).
- Hins vegar eru önnur lifrarensím (AST og ALT) eðlileg, sem dregur úr líkum á alvarlegum lifrarsjúkdómi.
- Hækkun bilirúbíns gæti stafað af Gilberts heilkenni, sem er algengur og saklaus erfðapáttur.
- Nauðsynlegt er að leita til heilbrigðisstarfsmanns til að greina uppruna hækkunar á alkalísku fosfatanum og bilirúbíni.



Hvít blóðkorn – Örlítið lækkuð

- Fjöldi hvítra blóðkorna er 4.0 K/mcL, sem er örlítið undir viðmiðunarmörkum (4.8–10.8 K/mcL).
- Hvít blóðkorn eru varnarsveit líkamans gegn sýkingum.
- Þetta getur verið eðlileg sveiflun eða tengt vægri veirusýkingu sem líkaminn hefur nýlega barist við.
- Þetta er yfirleitt ekki áhyggjuefni þegar það kemur eitt og sér.
- Mælt er með því að ræða þessa niðurstöðu við heilbrigðisstarfsmann til að meta hvort endurtekin mæling sé þörf.

Blóðflögur og stærð þeirra – Örlítið breytt

- Fjöldi blóðflagna er 151 K/mcL, sem er rétt við neðri mörk viðmiðunar (150–440 K/mcL), og meðalstærð blóðflagna (MPV) er 10.2 fL, sem er yfir viðmiðunarmörkum (6.8–9.6 fL).
- Stærri blóðflögur eru oft nýframleiddar og virkari.
- Þetta samband – blóðflögur við neðri mörk og stærri blóðflögur – bendir til þess að beinmergurinn sé að bæta upp með stærri og virkari blóðflögum.
- Þetta er yfirleitt ekki áhyggjuefni en gott er að ræða við heilbrigðisstarfsmann.

Próteinbúskapur – Örlítið breytt

- Glóbúlíngildi er 4 g/dL, sem er yfir viðmiðunarmörkum (2.0–3.5 g/dL), og albúmín/glóbúlín hlutfallið er 1, sem er örlítið undir viðmiðun (1.1–2.5).
- Albúmín er hins vegar eðlilegt (4.4 g/dL).
- Þetta bendir til aukinnar virkni ónæmiskerfisins, sem getur tengst langvinnri bólgu vegna reykinga eða ofnæmissvörun.
- Mælt er með því að ræða þetta við heilbrigðisstarfsmann til að meta hvort frekari rannsóknir séu nauðsynlegar.

Sýru-basa jafnvægi – Örlítið breytt

- CO₂-gildi (bikarbónat) er 30, sem er örlítið yfir viðmiðunarmörkum (22–29 mmol/L).
- Þetta getur bent til vægrar efnaskiptabasósu.
- Anion Gap er hins vegar eðlilegt (10), sem er jákvætt merki.
- Þetta getur tengst vökvajafnvægi eða nýrnastarfsemi.
- Mælt er með því að ræða þetta við heilbrigðisstarfsmann í samhengi við aðrar niðurstöður.



Rauð blóðkorn og blóðrauði – Eðlileg

- Öll gildi sem tengjast rauðum blóðkornum eru eðlileg.
- Rauð blóðkorn (4.78), blóðrauði (15.0 g/dL), blóðþéttni (45.4%), stærð rauðra blóðkorna (MCV 95.0 fL), magn blóðrauða í hverju korni (MCH 31.4 pg), þéttni blóðrauða (MCHC 33.0 g/dL) og stærðardreifing (RDW-CV 13.1%) eru öll innan viðmiðunar.
- Þetta bendir til góðrar súrefnisflutningsgetu blóðsins og eðlilegrar framleiðslu rauðra blóðkorna.

Blóðsykursstjórnun – Eðlileg

- Blóðsykur (94 mg/dL) og sykrað blóðrauði (HbA1c 5.5%) eru bæði vel innan eðlilegra marka.
- Þetta þýðir að líkaminn stjórnar blóðsykri vel bæði til skamms og langs tíma.
- Engin merki eru um sykursýki eða forstíga sykursýki.

Fitubúskapur – Eðlilegur

- Heildarkólesteról (175 mg/dL), HDL (48 mg/dL), LDL (104 mg/dL) og þríglýseríð (113 mg/dL) eru öll innan viðmiðunarmarka.
- Hlutföll kólesteróls eru einnig eðlileg.
- Þetta bendir til góðs fitujafnvægis í blóðinu og lágrar áhættu á fitutengdum hjarta- og æðavandamálum.

Skjaldkirtilsstarfsemi – Eðlileg

- TSH-gildi er 2.739 uIU/mL, sem er vel innan viðmiðunarmarka (0.358–3.740 uIU/mL).
- Þetta bendir til eðlilegrar starfsemi skjaldkirtilsins og góðrar efnaskiptastjórnunar.

Blöðruhálskirtill – Eðlilegur

- PSA-gildi er 0.90 ng/mL, sem er vel innan viðmiðunarmarka (0.00–4.00 ng/mL).
- Þetta bendir til eðlilegrar starfsemi blöðruhálskirtilsins hjá 61 árs karlmanni.

Saltbúskapur og vökvajafnvægi – Eðlilegt

- Natríum (140 mEq/L), kalíum (4.5 mmol/L), klóríð (105 mEq/L) og osmólalítet (281 mOsm/kg) eru öll innan eðlilegra marka.
- Þetta bendir til góðs vökvajafnvægis og eðlilegrar saltstjórnunar í líkamanum.





Barfnast eftirfylgni læknis

Alk Phos (Alkalískt fosfatasi)

Barfnast eftirfylgni læknis

166 U/L

Viðmiðunarmörk : 46–116 U/L

Alkalískt fosfatasi er ensím sem finnst í beinum og lifur – eins og mælikvarði á virkni þessara líffæra.

- Alkalískt fosfatasi er verulega yfir viðmiðunarmörkum.
- Þetta ensím er tengt bæði beinum og lifur, og hækkun getur stafað af auknum beinumbrotum eða beinendurnýjun, sem er algengara hjá karlmönnum yfir 60 ára aldri.
- Önnur möguleg orsök er lifrarkvilli, þó að önnur lifrarensím (AST og ALT) séu eðlileg, sem dregur úr líkum á alvarlegum lifrarsjúkdómi.
- Reykingar geta einnig haft áhrif á beinefnaskipti.
- Þessi hækkun krefst sérstakrar athygli heilbrigðisstarfsmanns til að greina uppruna ensímsins (bein eða lifur) og útiloka undirliggjandi sjúkdóma.
- Gott er að tryggja næga D-vítamín- og kalkneyslu úr fæðu, stunda reglulega þyngdarbæra hreyfingu (t.d. göngur 30 mínútur daglega) og forðast áfengisneyslu.
- Nauðsynlegt er að leita til heilbrigðisstarfsmanns til að rannsaka þessa hækkun nánar, þar sem aðeins læknir getur túlkað niðurstöðurnar rétt, greint orsökina og ákveðið næstu skref.

Kreatínín (Creatinine)

Barfnast eftirfylgni læknis

1.5 mg/dL

Viðmiðunarmörk : 0.6–1.3 mg/dL

Kreatínín er úrgangsefni frá vöðvum sem nýrun sía úr blóðinu – eins og mælikvarði á hversu vel nýrun þrifa blóðið.

- Kreatínínildi er verulega yfir viðmiðunarmörkum, sem bendir til þess að nýrun séu ekki að sía blóðið eins vel og æskilegt er.
- Þetta er í samræmi við skertan nýrnahraða (eGFR).
- Líklegasta orsökina er aldurstengt hnignun nýrnastarfsemi, sem getur versnað vegna reykinga sem skaða æðar nýrnanna.
- Fjölskyldusaga um háþrýsting er einnig áhættuþáttur fyrir nýrnaskerðingu, þar sem háþrýstingur getur skemmt smáæðar nýrnanna.
- Þessi niðurstaða krefst sérstakrar athygli vegna þess að viðvarandi skerðing á nýrnastarfsemi getur haft áhrif á heilsu til lengri tíma.
- Gott er að draga úr saltneyslu (minna en 5 grömm á dag), halda áfram reglulegri hreyfingu og forðast bólgueyðandi lyf án lyfseðils.
- Nauðsynlegt er að leita til heilbrigðisstarfsmanns til að meta nýrnastarfsemi nánar og ákveða hvort frekari rannsóknir séu nauðsynlegar.



eGFR (Áætlaður nýrnahraði)

þarfnast eftirfylgni læknis

49 mL/min/1.73m² (Non-AA) / 59 mL/min/1.73m² (AA)

Viðmiðunarmörk : >60 mL/min/1.73m²

eGFR mælir hversu vel nýrun síá blóðið – eins og flæðihraði vatnssíu. Því hærra sem gildið er, því betur virka nýrun.

- Nýrnahraði er undir 60 mL/min/1.73m², sem bendir til vægs til miðlungs skerðingar á nýrnastarfsemi.
- Þar sem sjúklingurinn er 61 árs, er eðlilegt að nýrnahraði lækki nokkuð með aldri, en gildi undir 60 krefjast nánari skoðunar.
- Reykingar eru þekktur áhættuþáttur sem skaðar æðar nýrnanna og getur hraðað hnignun.
- Fjölskyldusaga um háþrýsting eykur einnig áhættu á nýrnaskerðingu.
- Til að staðfesta hvort um langvarandi nýrnaskerðingu sé að ræða þarf að endurtaka mælingu eftir a.m.k.
- 3 mánuði, ásamt mælingu á próteinútskilnaði í þvagi.
- Gott er að draga verulega úr reykingum eða hætta, halda áfram hreyfingu og borða fjölbreytta fæðu með hóflegri próteinneyslu.
- Nauðsynlegt er að leita til heilbrigðisstarfsmanns sem getur metið nýrnastarfsemina nánar og ákveðið næstu skref.

Heildar bilirúbín (Total Bilirubin)

þarfnast eftirfylgni læknis

1.9 mg/dL

Viðmiðunarmörk : 0.1–1.0 mg/dL

Bilirúbín er gulbrúnt efni sem myndast þegar gömul rauð blóðkorn eru brotin niður – eins og úrgangur frá endurvinnslu gamalla flutningabíla sem lifrin vinnur úr.

- Heildar bilirúbín er verulega yfir viðmiðunarmörkum.
- Þetta þýðir að meira af þessu úrgangsefni safnast upp í blóðinu en eðlilegt er.
- Líklegasta orsökina er Gilberts heilkenni, sem er algengur og saklaus erfðapáttur sem veldur hækkuðu bilirúbíni, sérstaklega þar sem önnur lifrarensím (AST og ALT) eru eðlileg.
- Önnur möguleg orsök er aukin niðurbrot rauðra blóðkorna, þó að blóðrauði og rauð blóðkorn séu eðlileg, sem dregur úr þeim líkum.
- Þessi hækkun krefst athygli heilbrigðisstarfsmanns til að staðfesta orsökina og útiloka aðra þætti.
- Gott er að forðast áfengisneyslu, tryggja næga vökvaneyslu (1,5–2 lítra á dag) og borða grænmetisríka fæðu.
- Nauðsynlegt er að leita til heilbrigðisstarfsmanns til að rannsaka orsök hækkunarinnar nánar, þar sem aðeins læknir getur greint orsökina og ákveðið næstu skref.



WBC (Hvít blóðkorn)

Fylgjast með

4.0 K/mcL

Viðmiðunarmörk : 4.8–10.8 K/mcL

Hvít blóðkorn eru eins og öryggisverðir líkamans – þau vernda gegn sýkingum og sjúkdómum.

- Fjöldi hvítra blóðkorna er örlítið undir viðmiðunarmörkum.
- Líklegasta skýringin er eðlileg sveiflun milli einstaklinga eða tímabundin breyting, til dæmis vegna vægrar veirusýkingar sem líkaminn hefur nýlega barist við.
- Reykingar geta einnig haft áhrif á framleiðslu hvítra blóðkorna til lengri tíma.
- Þetta niðurstaða er yfirleitt ekki áhyggjuefni þegar hún kemur ein og sér, sérstaklega þar sem önnur blóðgildi eru eðlileg.
- Gott er að tryggja næga hvíld (7–8 klukkustundir á nóttu), borða fjölbreytta fæðu ríka af C-vítamíni (t.d. borða 2–3 ávexti á dag) og halda áfram reglulegri hreyfingu.
- Mælt er með því að ræða þessa niðurstöðu við heilbrigðisstarfsmann til að meta hvort endurtekin mæling sé þörf.

MPV (Meðalrúmmál blóðflagna)

Fylgjast með

10.2 fL

Viðmiðunarmörk : 6.8–9.6 fL

MPV mælir stærð blóðflagnanna – eins og að mæla stærð viðgerðarverkfæranna. Stærri blóðflögur eru oft virkari.

- Meðalstærð blóðflagna er örlítið yfir viðmiðunarmörkum.
- Þetta þýðir að viðgerðarverkfærin eru aðeins stærri en venjulega.
- Líklegasta orsökina er að beinmergurinn framleiðir nýjar, stærri blóðflögur til að viðhalda eðlilegum fjölda, sérstaklega þar sem heildarfjöldi blóðflagna er við neðri mörk.
- Reykingar geta einnig stuðlað að aukinni virkni blóðflagna.
- Þetta er yfirleitt ekki áhyggjuefni þegar blóðflagnafjöldi er eðlilegur, eins og hér.
- Gott er að halda áfram reglulegri hreyfingu (sem stuðlar að góðri blóðflæðingu), borða fisk ríkan af omega-3 fitusýrum (t.d. 2–3 sinnum í viku) og draga úr reykingum.
- Ráðlegt er að ræða þessa niðurstöðu við heilbrigðisstarfsmann sem getur metið hvort frekari eftirfylgni sé nauðsynleg.



30

Viðmiðunarmörk : 22–29 mmol/L

CO₂ í blóði endurspeglar bíkarbónat, sem er eins og stuðpúði sem heldur sýrustigi blóðsins stöðugu.

- CO₂-gildi er örlítið yfir viðmiðunarmörkum.
- Þetta getur bent til vægrar efnaskiptabasósu (of mikið bíkarbónat í blóðinu), sem getur stafað af vægri vökvaskorti eða magasýrutruflunum.
- Önnur möguleg skýring er að nýrun séu að bæta upp fyrir langvarandi öndunarvanda þar sem koltvísýringur safnast upp.
- Þar sem nýrnastarfsemi sýnir merki um skerðingu (kreatínín er hækkað), gæti það átt þátt í þessu jafnvægi.
- Þetta er yfirleitt ekki alvarlegt þegar frávikið er svona lítið.
- Gott er að tryggja næga vökvaneyslu (um 1,5–2 lítra á dag), borða fjölbreytta fæðu og forðast langvarandi föstu.
- Mælt er með því að ræða þetta við heilbrigðisstarfsmann sem getur metið sambandi við önnur gildi.

Glóbúlín (Globulín)

Fylgjast með

4 g/dL

Viðmiðunarmörk : 2.0–3.5 g/dL

Glóbúlín eru prótein sem gegna hlutverki í ónæmiskerfi og flutningi efna – eins og varðmenn og sendiboðar í blóðinu.

- Glóbúlíngildi er yfir viðmiðunarmörkum.
- Þetta getur bent til aukinnar virkni ónæmiskerfisins.
- Líklegasta orsökina er langvarandi örvun ónæmiskerfisins, til dæmis vegna reykinga sem valda langvinnri bólgu í loftvegum og líkamanum almennt.
- Ofnæmi fyrir frjókornum getur einnig stuðlað að hækkuðu glóbúlíngildi vegna aukinnar mótefnaframleiðslu.
- Þetta er athyglisvert í sambandi við eðlilegt albúmín og heildarprótein.
- Gott er að draga úr reykingum, forðast frjókornaofnæmisvalda eins og hægt er (t.d. loka gluggum á frjókornatímabilum) og borða andoxunarríka fæðu eins og ber og grænmeti daglega.
- Mælt er með því að ræða þetta við heilbrigðisstarfsmann sem getur metið hvort frekari rannsóknir séu nauðsynlegar.



1

Viðmiðunarmörk : 1.1–2.5

Þetta hlutfall ber saman tvo meginflokka próteína í blóðinu – eins og jafnvægis-mæling á milli flutningsskipa og varðmanna.

- Albúmín/glóbúlín hlutfallið er örlítið undir viðmiðunarmörkum.
- Þetta stafar af hækkuðu glóbúlíngildi frekar en lækkuðu albúmíni, þar sem albúmín er eðlilegt.
- Líklegasta skýringin er aukin ónæmiskerfisvirkni, sem getur tengst langvinnri bólgu vegna reykinga.
- Ofnæmi fyrir frjókornum getur einnig stuðlað að aukinni mótefnaframleiðslu.
- Þetta er yfirleitt ekki alvarlegt þegar albúmín er eðlilegt, en er gott að fylgjast með.
- Gott er að draga úr reykingum, tryggja fjölbreytta fæðu og halda áfram reglulegri hreyfingu.
- Ráðlegt er að ræða þetta við heilbrigðisstarfsmann til að meta hvort frekari rannsóknir séu þörf.



Eðlilegt

RBC (Rauð blóðkorn)

Eðlilegt

4.78 $\times 10^6/\text{mL}$

Viðmiðunarmörk : 4.70–6.10 $\times 10^6/\text{mL}$

Rauð blóðkorn eru eins og flutningabílar sem flytja súrefni frá lungum til allra líffæra líkamans.

- Fjöldi rauðra blóðkorna er innan eðlilegra marka, sem þýðir að líkaminn framleiðir nægilega marga flutningabíla til að flytja súrefni um líkamann.

Hgb (Blóðrauði)

Eðlilegt

15.0 g/dL

Viðmiðunarmörk : 13.7–16.7 g/dL

Blóðrauði er farmurinn í flutningabílunum (rauðu blóðkornunum) – hann bindur súrefnið og flytur það um líkamann.

- Blóðrauðagildi er eðlilegt, sem þýðir að flutningabílarirnir bera nægilegan farm af súrefni til vefja og líffæra.

Hct (Blóðþéttni)

Eðlilegt

45.4 %

Viðmiðunarmörk : 40.0–50.0 %

Blóðþéttni segir til um hversu stórt hlutfall blóðsins samanstendur af rauðum blóðkornum – eins og að mæla hversu mikið af rými í gámi er fyllt af farmi.

- Blóðþéttni er innan eðlilegra marka, sem bendir til góðs jafnvægis milli rauðra blóðkorna og vökva í blóðinu.

MCV (Meðalrúmmál rauðra blóðkorna)

Eðlilegt

95.0 fL

Viðmiðunarmörk : 80.0–100.0 fL

MCV mælir stærð hvers flutningabíls (rauðs blóðkorns) – hvort þeir séu of stórir, of litlir eða rétt á stærð.

- Stærð rauðra blóðkorna er eðlileg, sem þýðir að flutningabílarirnir eru á réttri stærð til að sinna hlutverki sínu vel.

MCH (Meðalmagn blóðrauða í hverju blóðkorni)

Eðlilegt

31.4 pg

Viðmiðunarmörk : 27.0–34.0 pg

MCH mælir hversu mikinn farm (súrefni) hver flutningabíll ber – magn blóðrauða í hverju rauðu blóðkorni.

- Magn blóðrauða í hverju rauðu blóðkorni er eðlilegt, sem þýðir að hver flutningabíll ber hæfilegan farm af súrefni.

MCHC (Meðalþéttni blóðrauða)

Eðlilegt

33.0 g/dL

Viðmiðunarmörk : 31.0–36.0 g/dL

MCHC mælir hversu þétt farmurinn er pakkaður í hverjum flutningabíl – þéttni blóðrauðans í rauðu blóðkornunum.

- Þéttni blóðrauða í rauðum blóðkornum er eðlileg, sem bendir til þess að farmurinn sé vel pakkaður í hverjum flutningabíl.



RDW-CV (Stærðardreifing rauðra blóðkorna)

Eðlilegt

13.1 %

Viðmiðunarmörk : 10.0–15.0 %

RDW mælir hversu mismunandi stórir flutningabílarnir eru – hvort þeir séu allir svipaðir á stærð eða mjög misjafnir.

- Stærðardreifing rauðra blóðkorna er eðlileg, sem þýðir að flutningabílarnir eru allir á svipaðri stærð og starfa samhæft.

Blóðflögur (Platelets)

Eðlilegt

151 K/mcL

Viðmiðunarmörk : 150–440 K/mcL

Blóðflögur eru eins og viðgerðarteymi líkamans – þær loka sárum og stöðva blæðingar.

- Fjöldi blóðflagna er innan eðlilegra marka, rétt við neðri mörk, sem þýðir að viðgerðarteymið er til staðar í nægilegum fjölda.

Natríum (Sodium)

Eðlilegt

140 mEq/L

Viðmiðunarmörk : 136–145 mEq/L

Natríum er eins og vatnsstjóri líkamans – það hjálpar til við að stjórna vökvajafnvægi og taugaboðum.

- Natríumgildi er eðlilegt, sem þýðir að vatnsstjórinn sinnir hlutverki sínu vel og vökvajafnvægi líkamans er í góðu lagi.

Kalíum (Potassium)

Eðlilegt

4.5 mmol/L

Viðmiðunarmörk : 3.5–5.1 mmol/L

Kalíum er eins og rafhlaða fyrir hjarta og vöðva – það tryggir að þeir virki rétt.

- Kalíumgildi er eðlilegt, sem þýðir að rafhlaðan er fullhlaðin og hjarta og vöðvar starfa eðlilega.

Klóríð (Chloride)

Eðlilegt

105 mEq/L

Viðmiðunarmörk : 98–107 mEq/L

Klóríð vinnur saman með natríumi og kalíumi til að halda vökvajafnvægi líkamans – eins og þriðji meðlimur vatnsstjórnunarteymisins.

- Klóríðgildi er eðlilegt, sem bendir til góðs jafnvægis í vökva- og saltbúskap líkamans.

AST (Aspartat aminótransferasi)

Eðlilegt

24 U/L

Viðmiðunarmörk : 15–37 U/L

AST er ensím sem finnst aðallega í lifur og hjarta – eins og viðvörðunarljós sem kviknar ef þessi líffæri verða fyrir álagi.

- AST-gildi er eðlilegt, sem bendir til þess að lifur og hjarta séu ekki undir óeðlilegu álagi.

ALT (Alanín aminótransferasi)

Eðlilegt

13 U/L

Viðmiðunarmörk : 12–78 U/L

ALT er ensím sem er sérstaklega tengt lifrinni – eins og sérstakt viðvörðunarljós fyrir lifrarstarfsemi.

- ALT-gildi er eðlilegt, sem bendir til góðrar lifrarstarfsemi.

BUN (Þvagefni í blóði)

Eðlilegt

18 mg/dL

Viðmiðunarmörk : 7–18 mg/dL

BUN mælir þvagefni í blóði – úrgangsefni sem nýrun sía úr blóðinu, eins og sorphirða sem tæmir ruslatunnuna.

- Þvagefni í blóði er við efri mörk en innan viðmiðunar.
- Þetta er athyglisvert í samhengi við hækkað kreatínín og skertan nýrnahraða, en gildið er enn eðlilegt.



Blóðsykur (Glucose)

Eðlilegt

94 mg/dL

Viðmiðunarmörk : 74–106 mg/dL

Blóðsykur er orkugjafi líkamans – eins og bensín í bíl sem heldur öllum líffærum gangandi.

- Blóðsykursgildi er eðlilegt, sem þýðir að líkaminn stjórnar orkugjafanum vel.

BUN/Kreatínín hlutfall

Eðlilegt

12.0

Viðmiðunarmörk : 10–20

Þetta hlutfall ber saman tvö úrgangsefni til að hjálpa til við að greina hvort nýrnavandamál stafi af nýrunum sjálfum eða öðrum orsökum – eins og greiningartæki.

- BUN/kreatínín hlutfallið er eðlilegt, sem bendir til þess að hækkun kreatíníns tengist líklegast nýrnastarfsemi frekar en öðrum orsökum eins og vöskvortí.

Kalsíum (Calcium)

Eðlilegt

9.4 mg/dL

Viðmiðunarmörk : 8.3–10.6 mg/dL

Kalsíum er steinefni sem er undirstaða beina og tanna – eins og sementsefni í byggingu sem heldur beinagrindinni sterkri.

- Kalsíumgildi er eðlilegt, sem bendir til góðs jafnvægis í kalsíumbúskap líkamans.
- Albúmíngildi er einnig eðlilegt, sem styrkir áreiðanleika þessarar mælingar.

Leiðrétt kalsíum (Corrected Calcium)

Eðlilegt

9 mg/dL

Viðmiðunarmörk : 8.3–10.6 mg/dL

Leiðrétt kalsíum tekur tillit til albúmínmagns í blóði til að gefa nákvæmari mynd af raunverulegu kalsíumgildi.

- Leiðrétt kalsíumgildi er eðlilegt, sem staðfestir að kalsíumbúskapur líkamans er í góðu jafnvægi.

Heildarprótein (Total Protein)

Eðlilegt

7.9 g/dL

Viðmiðunarmörk : 6.4–8.2 g/dL

Heildarprótein mælir allt prótein í blóðinu – eins og að mæla heildarbirgðir byggingarefna sem líkaminn notar til viðgerða og varnar.

- Heildarpróteingildi er eðlilegt, sem bendir til góðrar næringar og eðlilegrar próteinframleiðslu í líkamanum.

Albúmín (Albumin)

Eðlilegt

4.4 g/dL

Viðmiðunarmörk : 3.4–5.0 g/dL

Albúmín er mikilvægasta próteinið í blóði – eins og flutningaskip sem flytur efni um blóðrásina og heldur vökva á réttum stað.

- Albúmíngildi er eðlilegt, sem bendir til góðrar lifrarstarfsemi og næringarástands.



Anion Gap

Eðlilegt

10

Viðmiðunarmörk : 8–12 mEq/L

Anion Gap er reiknaður mælikvarði sem hjálpar til við að meta sýru-basa jafnvægi líkamans – eins og eftirlitskerfi sem greinir hvort efnafræðilegt jafnvægi blóðsins sé í lagi.

- Anion Gap er eðlilegt, sem bendir til góðs sýru-basa jafnvægis í líkamanum.

HbA1c (Sykrað blóðrauði)

Eðlilegt

5.5 %

Viðmiðunarmörk : 4.8–5.9 %

HbA1c sýnir meðalblóðsykur síðustu 2–3 mánaða – eins og dagbók sem skráir hversu vel blóðsykurinn hefur verið stjórnaður yfir lengri tíma.

- Sykrað blóðrauði er eðlilegt, sem þýðir að blóðsykursstjórnun hefur verið góð undanfarna mánuði.
- Þetta er í samræmi við eðlilegt blóðsykursgildi.

Osmólalítet (Osmolality)

Eðlilegt

281

Viðmiðunarmörk : 275–295 mOsm/kg

Osmólalítet mælir þéttni allra uppleysra efna í blóðinu – eins og mælikvarði á hversu „þykkt“ eða „þunnt“ blóðið er.

- Osmólalítet er eðlilegt, sem bendir til góðs vökvajafnvægis í líkamanum.

Þríglyseríð (Triglycerides)

Eðlilegt

113 mg/dL

Viðmiðunarmörk : 30–150 mg/dL

Þríglyseríð eru fituefni í blóðinu – eins og orkuforði sem líkaminn geymir til notkunar síðar.

- Þríglyseríðgildi er eðlilegt, sem þýðir að fituforðinn í blóðinu er í góðu jafnvægi.

Heildarkólesteról (Total Cholesterol)

Eðlilegt

175 mg/dL

Viðmiðunarmörk : 0–200 mg/dL

Heildarkólesteról mælir allt kólesteról í blóðinu – eins og heildarmagn fituefna sem flæða um æðarnar.

- Heildarkólesteról er eðlilegt, sem bendir til góðs fitujafnvægis í blóðinu.

HDL kólesteról

Eðlilegt

48 mg/dL

Viðmiðunarmörk : 40–60 mg/dL

HDL kólesteról flytur umframkólesteról aftur til lifrar til endurvinnslu – eins og sorphirða sem hreinsar æðarnar.

- HDL kólesteról er innan eðlilegra marka.
- Gott er að vita að nýlegar rannsóknir sýna að hátt HDL-gildi tryggir ekki endilega vernd gegn hjarta- og æðasjúkdómum.
- Fiskur, hnetur og ólífulía geta stuðlað að góðu HDL-gildi.



Heildarkólesteról/HDL hlutfall

Eðlilegt

4

Viðmiðunarmörk : <5

Þetta hlutfall ber saman heildarkólesteról við HDL – eins og jafnvægis mæling á milli allra fituefna og hreinsunarteymisins.

- Hlutfall heildarkólesteróls og HDL er eðlilegt, sem bendir til ásættanlegs fitujafnvægis í blóðinu.

LDL kólesteról

Eðlilegt

104 mg/dL

Viðmiðunarmörk : <116 mg/dL (<3.0 mmol/L)

LDL kólesteról flytur kólesteról til vefja – en of mikið getur safnast upp í æðaveggjum eins og kalk í vatnsleiðslum.

- LDL kólesteról er innan viðmiðunarmarka miðað við lágt hjarta- og æðaáhættustig.
- Gildið 104 mg/dL er vel undir markmiðinu.
- Fjölskyldusaga um háþrýsting er áhættuþáttur sem heilbrigðisstarfsmaður getur metið nánar, en LDL-gildið sjálft er eðlilegt.
- Fiskur, grænmeti og heilkorn stuðla að góðu kólesteróljafnvægi.

LDL/HDL hlutfall

Eðlilegt

2

Viðmiðunarmörk : <3.5

Þetta hlutfall ber saman LDL og HDL – eins og jafnvægi á milli kólesteróls sem safnast upp og kólesteróls sem er hreinsað burt.

- LDL/HDL hlutfallið er eðlilegt, sem bendir til góðs jafnvægis á milli mismunandi kólesterólgerða.

TSH (Skjaldkirtilsörvandi hormón)

Eðlilegt

2.739 uIU/mL

Viðmiðunarmörk : 0.358–3.740 uIU/mL

TSH er hormón sem stjórnar skjaldkirtlinum – eins og hitastillir sem segir skjaldkirtlinum hversu mikið af efnaskiptahormónum hann á að framleiða.

- TSH-gildi er eðlilegt, sem þýðir að hitastillirinn virkar vel og skjaldkirtillinn framleiðir hæfilegt magn af efnaskiptahormónum.

PSA (Blöðruhálskirtilssértækt mótefnavaki)

Eðlilegt

0.90 ng/mL

Viðmiðunarmörk : 0.00–4.00 ng/mL

PSA er prótein sem blöðruhálskirtillinn framleiðir – eins og mælikvarði á virkni kirtilsins. Hækkun getur bent til ýmissa breytinga.

- PSA-gildi er vel innan eðlilegra marka, sem bendir til eðlilegrar starfsemi blöðruhálskirtilsins.



**Heilbrigðisstarfsmaður – Ráðgjöf**

- Nokkrar niðurstöður í þessari greiningu krefjast athygli heilbrigðisstarfsmanns.
- Kreatínín og nýrnahraði (eGFR) benda til skerðingar á nýrnastarfsemi, alkalískt fosfatasi er verulega hækkað og bilirúbín er einnig yfir viðmiðunarmörkum.
- Mikilvægt er að leita til heilbrigðisstarfsmanns til að ræða þessar niðurstöður og ákveða hvort frekari rannsóknir séu nauðsynlegar.
- Heilbrigðisstarfsmaðurinn getur síðan vísað til sérfræðings ef þörf krefur.
- Þessi skýrsla er verkfæri sem er hannað til að auðvelda skilning á þessum niðurstöðum, eingöngu í upplýsinga- og fræðsluskyni.
- Hún kemur á engan hátt í stað læknisráðgjafar.
- Áður en tekna eru ákvarðanir varðandi heilsu eða meðferð er ráðgjöf læknis nauðsynleg.

**Þyngdarstjórnun**

- Miðað við 61 árs karlmann sem er 183 cm á hæð og vegur 77 kg er líkamsþyngdarstuðull (BMI) 23.0, sem er vel innan eðlilegra marka (18.5–24.9).
- Þetta er góð niðurstaða sem bendir til heilbrigðs líkamsþyngdar.
- Mikilvægt er að viðhalda þessari þyngd með reglulegri hreyfingu og fjölbreyttri fæðu.
- Ef þyngd breytist verulega er gott að ræða við heilbrigðisstarfsmann.
- Þessar upplýsingar eru veittar í fræðsluskyni og koma ekki í stað ráðgjafar heilbrigðisstarfsmanns, sem er nauðsynleg fyrir allar ákvarðanir tengdar þyngd.

**Mataræði og næring**

- Samkvæmt upplýsingum er ekki fylgt sérstöku mataræði.
- Miðað við hækkað alkalískt fosfatasi er gott að tryggja næga neyslu kalsíumríkra matvæla eins og mjólkurvara, grænmetis (t.d. brokkólí, grænkál) og fiska með beinum (t.d. sardínur).
- Til að styðja við nýrnastarfsemi er ráðlegt að skipta út hluta af unnum kjötvörum (pylsum, áleggi) fyrir ferskan fisk eða baunir, sem eru vægari á nýrun.
- Saltneyslu má draga úr með því að nota krydd og jurtir í stað salts við matreiðslu – stefna að minna en 5 grömmum af salti á dag.
- Borða ætti 5 skammta af ávöxtum og grænmeti daglega til að tryggja næga andoxunarefni og trefjar.
- Omega-3 fitusýrur úr fiski (2–3 skammtar á viku) styðja við hjarta- og æðaheilsu.
- Forðast ætti of mikla neyslu rauðs kjöts (ekki meira en 2–3 sinnum í viku) og velja frekar kjúkling eða fisk.
- Heilkorn (hafragrautur, rúgbrauð) í stað hvíts brauðs og hvítrar hrísgrjóna bæta trefjaneyslu.
- Þessar upplýsingar eru veittar í fræðsluskyni og koma ekki í stað persónulegrar næringaráætlunar, sem krefst sérfræðipækkingar næringarfræðings.

**Líkamsrækt og hreyfing**

- Miðað við 61 árs karlmann með BMI 23.0 og meira en 150 mínútur af hreyfingu á viku er þetta frábær grunnur.
- Þessi hreyfing uppfyllir lágmarksráðleggingar Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar.
- Til að styðja við beinaheilsu (í ljósi hækkaðs alkalíks fosfatasa) er gott að bæta við þyngdarbærri hreyfingu eins og göngum, tröppugöngu eða léttum þyngdaræfingum 2–3 sinnum í viku.
- Hreyfing styður einnig við nýrnastarfsemi og hjarta- og æðaheilsu.
- Þessar upplýsingar eru veittar í fræðsluskyni og eru ekki persónuleg æfingaáætlun, sem ætti helst að þróa með hæfum fagaðila.





Stressstjórnun og slökun

- Fyrir 61 árs karlmann er mikilvægt að hafa virka aðferðir til að takast á við streitu, þar sem streita getur haft áhrif á ónæmiskerfi og nýrnastarfsemi.
- Djúp öndun (4–7–8 tækni: anda inn í 4 sekúndur, halda í 7 sekúndur, anda út í 8 sekúndur) er einföld aðferð sem hægt er að nota hvar sem er.
- Regluleg útivist í náttúru, eins og 20–30 mínútna göngutúr í skógi eða við sjó, hefur sannað áhrif á streitu.
- Félagsleg tengsl og samvera við vini og fjölskyldu eru einnig mikilvæg til að viðhalda andlegri vellíðan.
- Þessar upplýsingar eru veittar í fræðsluskyni og eru ekki meðferðarráðleggingar, sem krefjast ráðgjafar hæfs fagaðila.



Svefn og bati

- Fyrir 61 árs karlmann er ráðlagður svefntími 7–8 klukkustundir á nóttu samkvæmt leiðbeiningum svefnrannsóknarstofnana.
- Upplýsingar um svefnlengd voru ekki gefnar upp, en gott er að tryggja nægan svefn til að styðja við bata og heilsu.
- Reglulegur svefntími (fara að sofa og vakna á svipuðum tíma á hverjum degi) styður við líkamsklukkuna.
- Forðast ætti skjái (síma, tölvur) a.m.k.
- 30–60 mínútum fyrir svefn.
- Svalt og dimmt svefnherbergi (um 18°C) stuðlar að betri svefngæðum.
- Þessar upplýsingar eru veittar í fræðslu- og upplýsingaskyni og eru ekki persónulegar læknisráðleggingar.



Vökvaneysla

- Fyrir 61 árs karlmann með BMI 23.0 og skerða nýrnastarfsemi er mikilvægt að viðhalda góðri vökvaneyslu.
- Ráðlögð dagleg vökvaneysla er um 1.5–2.0 lítrar, aðallega vatn.
- Vatn er besti valkosturinn, en jurtate og vatnsblönduð grænmetissúpa telja einnig með.
- Gott er að dreifa vökvaneyslunni yfir daginn frekar en að drekka mikið í einu.
- Forðast ætti of mikla neyslu koffíndrykkja (ekki meira en 3 bolla á dag) þar sem þeir geta aukið vökvatap.
- Þessar upplýsingar eru veittar í fræðsluskyni og eru ekki persónuleg læknisráðgjöf.



Sjúkdómavarnir

- Fjölskyldusaga um háþrýsting er mikilvæg upplýsing.
- Háþrýstingur er einn algengasti áhættuþátturinn fyrir hjarta- og æðasjúkdóma og nýrnaskerðingu.
- Mælt er með reglulegri blóðþrýstingsmælingu, t.d. á 6 mánaða fresti eða oftar ef heilbrigðisstarfsmaður ráðleggur.
- Einnig er gott að mæla blóðsykur og fitumælingar reglulega (t.d. árlega).
- Heilbrigður lífsstíll – hreyfing, fjölbreytt fæða, hófleg saltneysla og reykleysi – er besta forvörnin.
- Þessar upplýsingar eru veittar í upplýsinga- og fræðsluskyni og allar ákvarðanir varðandi eftirlit með erfðapáttum ættu að vera ræddar við hæfan heilbrigðisstarfsmann.



Ofnæmisstjórnun

- Frjókornaofnæmi getur valdið óþægindum á vorin og sumrin þegar frjókornamagn er hátt.
- Gott er að fylgjast með frjókornaspám og forðast útivist þegar magn er hátt, sérstaklega á morgnana og síðdegis.
- Loka gluggum á frjókornatímabilum og nota lofthreinsi inni getur dregið úr einkennum.
- Þvo hendur og andlit eftir útivist og skipta um fót til að fjarlægja frjókorn.
- Ef einkenni eru veruleg getur heilbrigðisstarfsmaður ráðlagt viðeigandi meðferð.
- Þessar upplýsingar eru veittar í fræðsluskyni og koma ekki í stað meðferðaráætlunar sem heilbrigðisstarfsmaður hefur sett, sem er viðmiðið fyrir alla sem þjást af ofnæmi.



Reykingabindindi

- Samkvæmt upplýsingum eru reyktar 3 sígarettur á dag.
- Jafnvel þótt þetta sé tiltölulega lítið magn, hafa reykingar skaðleg áhrif á æðar, nýru, bein og ónæmiskerfi – sem allt tengist niðurstöðum þessarar greiningar.
- Að hætta reykingum er eitt áhrifaríkasta skrefið til að bæta heilsu.
- Eftir 1 ár án reykinga minnkar áhætta á hjartasjúkdómum um helming.
- Nikótínplástrar, nikótínuggumí eða önnur hjálpartæki geta auðveldað ferlið.
- Stuðningur fjölskyldu og vina skiptir einnig máli.
- Þessar upplýsingar eru veittar í fræðsluskyni og eru ekki persónuleg áætlun um reykingabindindi, sem ætti að þróa með aðstoð heilbrigðisstarfsmanns.





Áfengisstjórnun

- Samkvæmt upplýsingum er áfengi drukkið stöku sinnum.
- Þetta er hóflegt neyslumunstur.
- Miðað við hækkað bilirúbín og skerða nýrnastarfsemi er gott að halda áfengisneyslu í lágmarki.
- Almennar leiðbeiningar mæla með að karlmenn drekki ekki meira en 2 staðlaða skammta á dag og hafi a.m.k.
- 2 áfengislausa daga á viku.
- Áfengi getur aukið álag á lifur og nýru.
- Þessar upplýsingar eru veittar í fræðsluskyni og eru ekki persónuleg læknisráðgjöf.





AÐGERÐ	NÁNAR	HEILSUMARKMIÐ
Hátt Ráðgjöf heilbrigðisstarfsmanns	<ul style="list-style-type: none">Leita til heilbrigðisstarfsmanns til að ræða hækkað kreatínín, skertan nýrnahraða (eGFR 49), hækkað alkalískt fosfatasi (166 U/L) og hækkað bilirúbín (1.9 mg/dL).Heilbrigðisstarfsmaðurinn getur pantað frekari rannsóknir eins og þvagrannsókn og beinmerkjagreiningu og vísað til sérfræðings ef þörf krefur.	<ul style="list-style-type: none">Greining á orsökum nýrnaskerðingar og hækkaðra lifrarensíma er lykilatriði til að vernda heilsu til lengri tíma.Snemmbær greining og meðferð geta komið í veg fyrir frekari skerðingu.
Hátt Reykingabindindi	<ul style="list-style-type: none">Hefja áætlun um að draga úr og hætta reykingum.Ræða við heilbrigðisstarfsmann um hjálpartæki eins og nikótínplástur eða nikótíntuggumí.Setja sér markmið um að minnka úr 3 sígarettum á dag í 1 og síðan hætta alveg.	<ul style="list-style-type: none">Að hætta reykingum bætir nýrnastarfsemi, dregur úr bólgu í líkamanum, styrkir ónæmiskerfið og minnkar áhættu á hjarta- og æðasjúkdómum verulega.Þetta er eitt áhrifaríkasta skrefið til að bæta heilsu.
Miðlungs Mataræði og næring	<ul style="list-style-type: none">Draga úr saltneyslu (minna en 5 g/dag) og auka neyslu á fiski (2–3 sinnum/viku), grænmeti og ávöxtum (5 skammtar/dag).Nota krydd og jurtir í stað salts.Forðast unnar kjötvörur og velja frekar ferskt kjöt eða fisk.	<ul style="list-style-type: none">Fjölbreytt og saltsnauð fæða styður við nýrnastarfsemi, beinaheilsu og hjarta- og æðaheilsu.Þetta getur hægt á frekari skerðingu nýrna og stuðlað að betra heilsufari.
Miðlungs Líkamsrækt og hreyfing	<ul style="list-style-type: none">Halda áfram reglulegri hreyfingu (meira en 150 mínútur á viku) og bæta við þyngdarbærri hreyfingu 2–3 sinnum í viku, eins og göngum, tröppugöngu eða léttum þyngdaræfingum.Nota hreyfingaforrit eða dagatal til að halda utan um æfingar.	<ul style="list-style-type: none">Regluleg hreyfing styður við beinaheilsu, nýrnastarfsemi og hjarta- og æðaheilsu.Þyngdarbær hreyfing styrkir bein og getur hjálpað til við að viðhalda beinþéttni.
Miðlungs Vökvaneysla	<ul style="list-style-type: none">Tryggja daglega vökvaneyslu um 1.5–2.0 lítra, aðallega vatn.Dreifa neyslunni yfir daginn og hafa vatnsflösku meðferðis.Takmarka koffíndrykkja við 3 bolla á dag.	<ul style="list-style-type: none">Góð vökvaneysla styður við nýrnastarfsemi og hjálpar nýrunum að sía úrgangsefni úr blóðinu.Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar nýrnastarfsemi er skert.
Lágt Svefn og bati	<ul style="list-style-type: none">Stefna að 7–8 klukkustunda svefni á nóttu.Setja reglulegan svefntíma og forðast skjái 30–60 mínútur fyrir svefn.Halda svefnherbergi svölu og dimmu.	<ul style="list-style-type: none">Góður svefn styður við bata líkamans, ónæmiskerfi og efnaskipti.Reglulegur svefn stuðlar að betri heilsu og vellíðan til lengri tíma.
Lágt Ofnæmisstjórnun	<ul style="list-style-type: none">Fylgjast með frjókornaspám og forðast útivist þegar frjókornamagn er hátt.Nota lofthreinsi inni og loka gluggum á frjókornatímabilum.	<ul style="list-style-type: none">Góð ofnæmisstjórnun dregur úr óþægindum og getur minnkað ónæmiskerfisvirkni sem tengist hækkuðu glóbúlíngildi.

- Þvo hendur og andlit eftir útivist.





Spurningar til að spyrja lækinn

1

NÝRNASTARFSEMI

Nýrnahraðinn minn (eGFR) var 49 og kreatínín hækkað – hvað þýðir þetta nákvæmlega og hvaða frekari rannsóknir þarf að gera til að meta nýrnastarfsemina betur?

2

LIFUR OG BEIN

Alkalískt fosfatasi var verulega hækkað (166 U/L) – er hægt að greina hvort þetta stafi af beinum eða lifur, og hvaða rannsóknir gætu hjálpað til við að finna orsökina?

3

BILIRÚBÍN

Bilirúbín var næstum tvöfalt yfir viðmiðunarmörkum – gæti þetta verið Gilberts heilkenni eða þarf að rannsaka aðrar orsakir?

4

FORVARNIR

Í ljósi fjölskyldusögu um háþrýsting og skerðingar á nýrnastarfsemi – hversu oft ætti að mæla blóðþrýsting og hvaða forvarnir eru mikilvægastar til að vernda nýrun?

5

REYKINGAR

Ég reyki 3 sígarettur á dag – hvaða áhrif hafa reykingar á nýrnastarfsemi og beinaheilsu, og hvaða hjálpartæki eru best til að hætta reykingum?



Eðli tólsins: Lausnin Blood Interpretation er ekki hönnuð til sjúkdómsgreiningar, meðferðar eða lækningar á neinum sjúkdómum.

Henni er ætlað að hjálpa þér að skilja niðurstöðurnar þínar betur áður en þú ræðir þær við lækinn þinn. Hún kemur undir engum kringumstæðum í stað læknisráðgjafar. Áður en þú tekur nokkra ákvörðun um heilsu þína eða meðferð við sjúkdómi skaltu ráðfæra þig við lækinn þinn eða viðurkenndan heilbrigðisstarfsmann.



Takmarkanir gervigreindar: Þessi skýrsla er búin til af gervigreind, ekki af heilbrigðisstarfsmanni, og getur því innihaldið villur.

Gagnsemi hennar ræðst jafnframt beint af þeim upplýsingum sem þú gafst upp. Ef mikilvægar upplýsingar um aðstæður þínar vantar, eða ef nauðsynleg mæligildi vantar í rannsóknarniðurstöðurnar, byggja útskýringarnar á ófullnægjandi gögnum og geta verið ófullkomnar eða átt illa við um þínar aðstæður.

